

Ueber den Einfluss
der
Temperatur und der Ernährung
auf die
Kohlensäureproduktion im Thierkörper.

~~~~~  
**Inaugural-Dissertation**

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt

der hohen medizinischen Fakultät der Universität Erlangen


am 20. Juli 1889

von

**Wilhelm Birkholz**

aus

Behrendshagen.



ERLANGEN.

Druck der Universitäts-Buchdruckerei von Junge & Sohn.

1889.



Ueber den Einfluss  
der  
**Temperatur und der Ernährung**  
auf die  
**Kohlensäureproduktion im Thierkörper.**

~~~~~  
Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt

der hohen medizinischen Fakultät der Universität Erlangen


am 20. Juli 1889

von

Wilhelm Birkholz

aus

Behrendshagen.



ERLANGEN.

Druck der Universitäts-Buchdruckerei von Junge & Sohn.

1889.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät.

Referent: Herr Prof. Dr. J. Rosenthal.

Seinen geliebten Eltern

in Dankbarkeit

gewidmet.

Der Verfasser.

Wohl kaum hat ein physiologischer Vorgang im thierischen wie menschlichen Organismus ebenso sehr den Anlass zum Nachdenken als auch Spielraum zur Aufstellung der verschiedensten Theorien gegeben, als die Athmung. — Das Alterthum und Mittelalter, beide mit der Art und Weise der Circulation des Blutes unbekannt, erging sich, beeinflusst von den verschiedenen philosophischen Systemen, in den widersprechendsten Vermuthungen und Anschauungen. — Dem Engländer Wilhelm Harvey war es vorbehalten, am Anfange des siebzehnten Jahrhunderts nach siebzehnjähriger Forschung den Kreislauf des Blutes festzustellen und so doch dem Athem, der Luft einen Träger, welcher sie nach allen Theilen des Körpers führt, zu geben. Von dem chemischen Prozesse, welcher hierdurch hervorgerufen wird, hatte man noch keine klare Vorstellung, da man ja noch nichts von der Beschaffenheit der Inspirations- und Expirationsluft wusste; man nahm ein räthselhaftes Agens an, welches das Blut aus der Atmosphäre mitgetheilt erhielt und in den einzelnen Körpertheilen abgab, um es in den Lungen von Neuem wieder aus der Luft zu beziehen. Da entdeckte am Ende des achtzehnten Jahrhunderts Priestley den Sauerstoff, Lavoisier den Stickstoff und somit die Zusammensetzung der Atmosphäre; die Kohlensäure und der Wasserstoff waren schon über ein Jahrhundert vorher von Baptist Helmont aufgefunden worden. Lavoisier's Scharfsinn war es nun auch, der dieses vorher

angedeutete räthselhafte Agens in dem Sauerstoff der Luft erkannte und den vorher unerklärlichen Vorgang im Thierkörper als einen chemischen bezeichnete; ihm war es klar, dass analog der Verbrennung organischer Verbindungen die chemischen Vorgänge im Thierkörper im Wesentlichen in der Oxydation von kohlenstoff- und wasserstoffhaltigen Substanzen des Thierleibes durch den bei der Athmung aus der atmosphärischen Luft aufgenommenen Sauerstoff bestehen. Nur der Ort, wo diese chemischen Umsetzungen stattfinden, war weder ihm bekannt, noch gelang es einer grossen Anzahl von Gelehrten und Forschern hierüber Klarheit zu gewinnen; es tauchte bald diese bald jene Theorie auf, bis die Arbeiten von Magnus, Ludwig, Pflüger, Hüfner u. A. über den Luftgehalt beider Blutarten einerseits und die Beobachtungen von Hoppe-Seyler und J. J. Müller andererseits diese Frage zur endgiltigen Entscheidung brachten. — Die erstgenannten Forscher zeigten durch Experimente, dass das arterielle Blut keinen irgend erheblichen Verlust seines Sauerstoffgehaltes auf dem Wege bis zu den Capillaren erleidet, während das venöse Blut einen merkbaren Mindergehalt von Sauerstoff gegenüber dem arteriellen aufweist. Aus dieser Erfahrung ergibt sich der wichtige Schluss, dass der Verbrauch des Blutsauerstoffs auf dem Wege durch die Capillarbahn erfolgt. Dieser Vorgang, die sogenannte innere Athmung im Gegensatz zur äusseren, d. i. der Austausch zwischen den Gasen des Blutes und denen der Atmosphäre in den Lungen, findet nun nicht im Capillarblut statt, sondern, wie die vorhergenannten Hoppe-Seyler, J. J. Müller gezeigt haben, in den Geweben. — Hoppe-Seyler's Beobachtungen zeigen, dass Blut, mit leicht oxydablen Stoffen, Zucker oder Milchsäure, versetzt, selbst bei Körpertemperatur nicht oxydirend wirkt und keine wesentliche Abnahme seines Sauerstoffs und Zunahme der Kohlensäure zeigt; wohl aber, wie

J. J. Müller dargethan hat, wenn das mit Zucker oder Milchsäure versetzte Blut künstlich durch ein frisch ausgeschnittenes, sogenanntes überlebendes Organ, z. B. die Niere oder den Muskel geleitet wird, so dass es allseitig mit den Gewebszellen in innige Berührung tritt. — Wo aber in den Geweben, unter welchen Umständen und nach welchen Verhältnissen diese Prozesse sich abspielen, ist vollständig unbekannt. Nur so viel kann man behaupten, dass die Gewebe zum Sauerstoff eine grössere Affinität besitzen als das Blut, sonst könnten ihn jene diesem nicht entziehen. — Sind demnach die Gewebe die eigentlichen Stätten der Zersetzung und Oxydation, so ist wieder andererseits sicher die Lunge der Ort, wo das venöse Blut durch Abgabe von Kohlensäure und Aufnahme von Sauerstoff von neuem in den Stand gesetzt wird, seiner Aufgabe in den Geweben zu genügen. Diese, die äussere Athmung genannt, kann man wohl nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung, was die Sauerstoffaufnahme anbetrifft, als einen rein chemischen Prozess betrachten und zwar nimmt das gasfreie reduzierte Hämoglobin in den Lungen Sauerstoff zur Bildung von Oxyhämoglobin auf. Dass wir es hier mit einem rein chemischen Prozesse zu thun haben, geht daraus hervor, dass das Blut beim Athmen in reinem Sauerstoff nicht mehr O aufnimmt, als beim Athmen in atmosphärischer Luft, ferner daraus, dass, wenn man ein Thier in einem abgeschlossenen Raume ersticken lässt, der Erstickungsraum fast vollkommen frei von Sauerstoff ist. Wäre die respiratorische Sauerstoffaufnahme ein Diffusionsprozess, so müsste entsprechend dem Partialdrucke des Sauerstoffs im ersten Falle viel mehr Sauerstoff aufgenommen werden, im letzteren Falle könnte eine so weitgehende Aufnahme nicht mehr stattfinden. — Diese Gesetze der Diffusion bei der O-Aufnahme kommen nur in soweit in Betracht, als der Sauerstoff, um zu den rothen Blutkörperchen zu ge-

langen, allerdings zuerst in das Plasma diffundiren muss, hier aber sofort von den Körperchen chemisch gebunden wird. —

Was die Kohlensäureabgabe anbetrifft, so darf man hierbei nicht lediglich von einem chemischen Prozess sprechen, sondern muss daneben noch eine einfache Absorption annehmen; das Serum des Blutes ist hier der Träger. — Die Ausscheidung der Kohlensäure geht in den Lungenbläschen einerseits nach den Gesetzen der Diffusion vor sich, da in denselben bedeutend mehr Kohlensäure als in den Bronchien vorhanden ist. Es findet also schon im ruhigen Thorax ein Gasaustausch statt. Das beste Beispiel hierfür ist der Winterschlaf einzelner Thiere. — Andererseits jedoch ist es nicht allein der Spannungsausgleich, sondern entschieden spielen hierbei auch chemische Prozesse eine wichtige Rolle; denn die Sauerstoffaufnahme seitens der rothen Blutkörperchen wirkt CO_2 austreibend, indem die Blutkörperchen gleichsam die Rolle einer schwachen Säure spielen. Ferner aber geschieht, wie experimentell nachgewiesen ist, die Aufnahme von Kohlensäure im Blut bei verschiedenem Druck nicht proportional den Druckgrößen, was ja ein direkter Beweis ist, dass ein Theil chemisch gebunden sein muss. — Die ganze Chemie der Athmung wird nun verständlich, wenn man bedenkt, dass die lebenden Zellen und die Gewebeelemente des thierischen Körpers zur Leistung ihrer Arbeit auf den Verbrauch derjenigen chemischen Spannkraft angewiesen sind, welche bei der Assimilation in der Pflanzenwelt entsteht. — Die Verbindungen des Pflanzenleibes: die Eiweisskörper, Kohlenhydrate und Fette werden von den Thieren entweder direkt aufgenommen, so von den Pflanzenfressern, oder erst, nachdem sie zum Bestandtheil des Leibes von einem Pflanzenfresser geworden sind, welcher letzterer dem Fleischfresser und dem Menschen zur Nahrung dient. Aber gleichviel,

ob Herbivore oder Carnivore, im Organismus aller Thiere zerfallen die organischen, ursprünglich der Pflanze entlehnten Verbindungen vornehmlich wieder zu Kohlensäure, Harnstoff und Wasser und werden in dieser Form nach aussen abgegeben. Bei diesem Zerfall jener pflanzlichen Stoffe werden die in ihnen angehäuften Spannkkräfte frei, gehen in lebendige Kraft: Wärme, Muskelbewegung und Elektrizität über, so dass die Lebenserscheinungen der Thiere an die Zersetzung der den Pflanzen entstammenden, in den Thierleib aufgenommenen organischen Verbindungen geknüpft sind. Wie leicht ersichtlich, stehen diese drei Faktoren, die Einnahme, die Abgabe und die geleistete Kraft in innigem ursächlichen Zusammenhange, bedingen sich untereinander, und wird der eine das Maass für den andern sein. — So zeigen uns auch die oben angegebenen Endprodukte: die Kohlensäure, der Harnstoff und das Wasser das Maass und die Ausdehnung der im thierischen wie menschlichen Körper sich abspielenden Prozesse an. — Vor allem aber ist die Kohlensäure das Hauptendprodukt der im Körper stattfindenden Verbrennung, und ermöglicht uns somit die Bestimmung derselben in der Expirationsluft einen Schluss auf die vorher besprochenen Vorgänge im Körper zu machen. — Eine Reihe von Versuchen, unternommen mit den verschiedensten Apparaten — ich erwähne nur den von Scharling, Regnault und Reiset und den verbesserten von v. Pettenkofer — haben nun gezeigt, dass die Kohlensäureabgabe beeinflusst wird von den verschiedensten Verhältnissen. Die Grösse derselben hängt ab von den einzelnen Athembewegungen, vom Alter, Geschlechte, der Körperkonstitution, der Thätigkeit, dem Kohlensäuregehalt der Luft, dem Lichte, der Tageszeit, der Temperatur und der Nahrung. Die beiden wichtigsten Momente sind nun wohl entschieden die beiden zuletzt genannten: die Temperatur und der Ernährungszustand, und sind es vor

Allen Veränderungen dieser Faktoren, welche als letzter Grund die Veränderungen der CO_2 -Ausscheidung unter den mannigfach genannten Verhältnissen bedingen. Wie schon gesagt, werden durch die chemischen Prozesse, den Zerfall der Eiweissstoffe, Kohlehydrate und Fette die potentiellen Energien frei und werden fortwährend in kinetische Energien, d. h. Wärme und Bewegung übergeführt. — Werden daher durch Veränderung der umgebenden Temperatur jeweilig andere Anforderungen an die Wärmeproduktion des Körpers gestellt, so wird damit auch entschieden eine Veränderung in der chemischen Zersetzung im Körper Hand in Hand gehen. Andererseits wird durch eine vermehrte resp. verminderte Nahrungsaufnahme ein verschieden ausgedehnter chemischer Prozess im Körper hervorgerufen. In beiden Fällen wird sich demnach auch die Kohlensäureabgabe in bestimmter Weise verschieden verhalten. — Zugleich darf man aber nie nur eins der beiden erwähnten Hauptmomente berücksichtigen, sondern muss sie stets zusammen beobachten, wie auch andererseits all den andern Verhältnissen gleichfalls Rechnung tragen. —

Meine Aufgabe war es nun, hauptsächlich die beiden vorerwähnten Hauptzustände ins Auge zu fassen und durch Versuche an Thieren den Gehalt der Exspirationsluft an Kohlensäure bei verschiedenen Temperaturen, bei den verschiedenen Stadien der Verdauung, beim Hungerzustande und schliesslich wieder im Stadium der Anfütterung zu prüfen.

Zu den ersten achtundzwanzig Versuchen bediente ich mich folgenden Apparates:

Derselbe besteht zunächst aus einer Glasglocke, welche auf einem mit einer kreisrunden Rinne versehenen Tischchen ruht. Wird die Rinne mit Quecksilber gefüllt und die Glocke in dieselbe gesetzt, so ist der Innenraum der Glocke von der atmosphärischen Luft vollkommen abgeschlossen. Durch dieses Tischchen führten zwei Oeffnungen unter die

Glasglocke, die eine bildete die Zuleitungs-, die andere die Ableitungsöffnung; — letztere ist im weiteren Verlaufe mit einer Aspirationsvorrichtung, bestehend in einer nach Litern ausgemessenen, mit Wasser gefüllten Tonne, verbunden. Es ist einleuchtend, dass, wenn das Wasser aus der Tonne ausfliesst, ununterbrochen frische Luft in die Glasglocke eintreten und die mit den Athmungsgasen gemischte Glockenluft gegen die Tonne hin entweichen muss. Mit der Zuleitungsöffnung sind mehrere mit Aetzkali gefüllte Flaschen und Kalithürme in Verbindung, in welchen die zugeleitete Luft völlig von Kohlensäure befreit wird, so dass dem unter der Glocke sich befindenden Thiere nur völlig CO_2 -freie Luft zuströmt. Um mich zu überzeugen, dass die atmosphärische CO_2 sicher absorhirt war, schaltete ich kurz vor der Oeffnung noch eine Flasche mit Barytlösung ein, welche sich getrübt hätte, sobald die Vorlagen nicht mehr ihre Schuldigkeit gethan hätten. — Von der Ableitungsöffnung aus wird die Respirationsluft zuerst durch mehrere mit Barytwasser gefüllte Erlenmeyer'sche Flaschen, dann durch eine Anzahl Pettenkofer'scher Röhren geleitet, welche den Zweck haben, sämmtliche expirirte Kohlensäure zu binden. Dass dieses auch wirklich geschieht, zeigt wiederum eine am Schlusse befindliche mit Barytwasser gefüllte Indikatorflasche an. —

Der Vorzug dieses Apparates besteht darin, dass man sowohl sämmtliche expirirte Kohlensäure gebunden, als auch ein genaues Maass der durchgeleiteten Luft erhält, welches uns die ausgemessene und an einem Seitenrohr graduirte Wassertonne anzeigt; der Nachtheil besteht darin, dass man stets mit einer grossen Menge Barytwasser arbeiten und viel Zeit zu der jedesmaligen Instandsetzung des Apparates anwenden muss und ferner darin, dass die Glasglocke so klein ist, dass dem zum Versuche benutzten Kaninchen jede Bewegung gehemmt ist. — Um diesem Uebelstande

abzuhelfen, benutzte ich zu den meisten der folgenden Versuche einen Apparat, bei welchem ich nur einen abgemessenen Theil der expirirten Luft von einer Barytlösung binden liess und dem Thiere einen grösseren Spielraum gewährte. — Ein mit Glasscheiben versehener, dicht gefügter Kasten mit eisernem Rahmen besitzt eine Oeffnung zum Eintritt der Luft. Eine zweite Oeffnung gewährt der abgeleiteten Luft den Austritt. Eine mit der Wasserleitung verbundene Saugpumpe erneuert ununterbrochen in dem Kasten, in welchem sich das Thier befindet, die Luft. — Letztere wird zunächst durch ein eingeschaltetes T-Rohr getheilt, und zwar geht der eine Theil durch eine Gasuhr, welche diesen Theil der Luft misst, der andere Theil wird mit Hilfe einer Aspirationsvorrichtung, bestehend aus einer genau 12,26 Liter fassenden Heberflasche, durch zwei Erlenmeyer'sche Flaschen und eine Pettenkofer'sche Röhre, welche eine bestimmte Menge Barytwasser enthalten, geleitet. Um auch hier sicher zu sein, dass sämmtliche Kohlensäure gebunden ist, wird zum Schlusse gleichfalls eine mit Barytwasser gefüllte Indikatorflasche eingeschaltet. — Aus dem Verhältniss dieser durchgeleiteten Luft zu der an der Gasuhr abzulesenden ist es nicht schwer, die von dem Thiere produzierte Kohlensäure zu berechnen, von welcher Menge dann noch der Kohlensäuregehalt der eingeathmeten Atmosphäre in Abzug kommt. — Dieser Apparat vermeidet, wie schon angedeutet, den Verbrauch von zu grossen Mengen Barytwasser, gewährt dem Thiere im Apparat Bewegung und dem Experimentirenden eine leichtere Handhabung, hat aber gegen den vorhererwähnten den Nachtheil, dass ein kleiner sich etwa einschleichender Fehler durch die Berechnung ein wesentlicher werden kann. —

Drittens habe ich nun, um mit kleineren Thieren noch Versuche zu machen, einen Apparat gebraucht, welcher

dem ersten sehr ähnlich ist und zu welchem ich die schon erwähnte Glasglocke wieder benutzte; nur dass ich den Luftstrom durch die Saugpumpe bewirkte, ohne ihn zu messen, denselben aber in jedem Falle so stark wählte, dass die Ventilation dem unter der Glocke sich befindenden Thiere genügen musste.

Die Bestimmung der Kohlensäure geschah durch Titiren nach v. Pettenkofer's Methode. Die zu untersuchende Luft wurde, wie schon mehrmals erwähnt, durch ein bestimmtes Volumen einer Aetzbarytlösung geleitet. Die Kohlensäure wird hier chemisch gebunden zu Baryumcarbonat. Mit einer titrirten Oxalsäurelösung wird die Flüssigkeit schliesslich neutralisirt; je mehr Baryum bereits von Kohlensäure gebunden war, um so weniger Oxalsäure ist zur Neutralisation nöthig und umgekehrt. Zur Darstellung der Oxalsäurelösung löst man reine, krystallisirte, nicht verwitterte Oxalsäure 28,636 Gr., die zur Trocknung einige Zeit unter einer Glasglocke über concentrirter Schwefelsäure gestanden hat, in 1 Liter Wasser. 1 Cemtr. dieser Lösung entspricht in seiner Stärke 1 Centigr. Kohlensäure. — Die Barytlösung wurde durch Auflösen von 300 Gr. krystallisirtem Baryumhydrat und 1 Gr. Chlorbaryum in 7 Liter Wasser bereitet. — Zur leichteren Verständlichkeit sei es mir gestattet, hier an einem Beispiel das genaue Verfahren und die Berechnung klar zu legen: Ich nehme den zweiten der angeführten Versuche. — Die Absorptionsflüssigkeit bestand in diesem Falle aus 2600 Cemtr. Barytlösung. Nachdem $1\frac{1}{2}$ Stunde die Expirationsluft des Kaninchens durch diese hindurchgeleitet war und die Aspirationsvorrichtung einen Verbrauch von 66 Litern anzeigte, wurde der Versuch abgestellt. Die in den Erlenmeyer'schen Flaschen und Pettenkofer'schen Röhren befindliche, stark getrübbte Barytlösung lässt man sich absetzen und entnimmt der geklärten Lösung mit einer Pipette 50 Cemtr.; dieselben werden in

einen Kolben gethan, hierauf einige Tropfen einer Lösung von Rosolsäure hinzugefügt, wodurch Röthung eintritt. Wird nun Oxalsäure zugesetzt, so zeigt sich Entfärbung des Gemisches durch den geringsten Ueberschuss dieser Säure. Man lässt in dieses Gemisch aus einer graduirten Bürette so lange unter Schütteln von der vorher erwähnten Oxalsäurelösung einlaufen, bis Entfärbung der Flüssigkeit eintritt. Die Zahl der verwendeten Cemtr. Säurelösung, in diesem Falle 22,5 Cemtr., der Endtiter genannt, wird notirt. — Nun werden in gleicher Weise 50 Cemtr. der frischen Barytlösung durch die Oxalsäurelösung genau bis zur Neutralisation titirt; auch hier wird die Menge der verwendeten Säurelösung, in diesem Fall 29,6 Cemtr., der Anfangstiter genannt, notirt. — Durch Subtraktion findet man die Differenz der in beiden Titirungen verwendeten Oxalsäuremengen = 7,1 Cemtr. Diese Differenz entspricht somit 7,1 Centigr. CO_2 . Nun betrug aber die verwendete Barytlösung 2600 Cemtr., also 52 mal 50; damit ich die Werthe in Grammen erhalte, dividire ich dieses Produkt noch mit 100 und gelange so zu $\frac{7,1 \cdot 2600}{100 \cdot 50} = \frac{0,071 \cdot 2600}{50} = 0,071 \cdot 52 = 3,692 \text{ Gr.}$ Der Versuch hatte $1\frac{1}{2}$ Stunde gedauert: also beläuft sich die Produktion der Kohlensäure für 1 Stunde auf 2,461 Gr. bei einer gleichzeitigen Ventilation von 44 Litern.

Hieran reihe ich sofort die Berechnung der Kohlensäure bei Gebrauch der beiden anderen Apparate; ich werde versuchen dieselbe ebenfalls an Beispielen klar zu machen. —

Im XXIX. Versuche zeigte z. B. die Gasuhr eine Ventilation von 160,6 Litern an, hierzu kommt nun noch die durch die Aspirationsflasche von 12,26 Liter Inhalt hervorbrachte Ventilation; mithin beträgt dieselbe im Ganzen 172,86 Liter. Der Anfangstiter von 50 Cemtr. Barytwasser

war = 30,5, der Endtiter = 25,8 Cemtr. Oxalsäure; die Titerdifferenz also = 4,7; verwendet waren 500 Cemtr.: es ergibt sich demnach als Gesamttiterdifferenz $10 \times 4,7$ Cemtr. = 0,47 Gr. CO_2 . — Diese 0,47 Gr. beziehen sich auf 12,26 Liter Luft, die ganze Ventilation betrug aber 172,86 Liter; es ist diese Summe also durch 12,26 zu dividiren und der erhaltene Quotient 14,09951, Ventilationsfaktor genannt, mit obigen 0,47 zu multiplizieren, was 6,6267697 ergibt. Hiervon kommt nun noch in Abzug der Kohlensäuregehalt der eingeathmeten Atmosphäre, auf 172,86 Liter 0,13416 betragend; mithin beträgt nun die ganze produzierte Kohlensäure 6,4926097 Gr. Der Versuch hat 3,5166 Stunden gedauert: also ergibt sich die CO_2 -Ausscheidung auf 1 Stunde berechnet zu 1,846 Gr.

Zur Berechnung der im dritten Apparate angestellten Versuche diene mir der I. dieser Reihe als Beispiel. Die Absorptionsflüssigkeit betrug 1200 Cemtr.; der Anfangstiter auf 50 Cemtr. = 30,4, der Endtiter = 21,3, die Differenz 9,1, welche also 9,1 Centigr. CO_2 repräsentiren; 1200 Cemtr. sind gebraucht, also ist die Differenz mit $\frac{1200}{50} = 24$ zu multiplizieren. Dies ergibt 218,4 Centigr. = 2,184 Gr. Die Versuchszeit belief sich aber auf 2,25 Stunden, also sind in 1 Stunde 0,97 Gr. Kohlensäure ausgeschieden. —

Als Versuchsthiere dienten mir während der ganzen Arbeit drei Kaninchen, ferner drei Ratten und zwei Katzen.

In folgender Tabelle sind die mit dem ersten Kaninchen, nennen wir es A, unternommenen Versuche in der Reihenfolge, wie dieselben angestellt sind, verzeichnet.

Kaninchen A wiegt rund 2400 Gr; es erhält täglich als

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur im Zimmer ev. im Freien	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Ventilation während des ganzen Versuches
I. 21./III.	Kaninchen unter der Glasglocke im Zimmer; ist vorher gefüttert	11 ²⁵ —12 ⁵⁵ Vorm. = 1,5 Std.	12,5 ° C.	{40° C. 40° C.	70 Liter
II. 21./III.	Desgleichen	4—5 ³⁰ Nachm. = 1,5 Std.	12,5 ° C.	{40° C. 39,8° C.	66 Liter
III. 22./III.	Desgleichen	10 ³ —12 ³ Vorm. = 2 Std.	10,2 ° C.	{40° C. 39° C.	79 Liter
IV. 22./III.	Desgleichen	3 ⁸ —5 ⁸ Nachm. = 2 Std.	10,3 ° C.	{40° C. 40° C.	64 Liter
V. 23./III.	Desgleichen	9 ⁴⁸ —11 ¹⁸ Vorm. = 1,5 Std.	10,2 ° C.	{40° C. 40° C.	60 Liter
VI. 23./III.	Desgleichen	1 ⁵⁰ —3 ²⁰ Nachm. = 1,5 Std.	10,3 ° C.	{40,0° C. 40,5° C.	60 Liter
VII. 26./III.	Desgleichen	11 ³ —12 ³³ Vorm. = 1,5 Std.	12,0 ° C.	{40° C. 39,5° C.	50 Liter
VIII. 26./III.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; ist vorher gefüttert	3 ⁵² —5 ²² Vorm. = 1,5 Std.	{20° C. 7° C.	{40° C. 39° C.	51 Liter
IX. 27./III.	Desgleichen	11 ²⁰ —12 ⁵⁰ Vorm. = 1,5 Std.	{16° C. 6° C.	{40° C. 39° C.	48 Liter
X. 27./III.	Kaninchen unter der Glasglocke im Zimmer; ist vorher gefüttert	4 ¹⁶ —5 ⁴⁶ Nachm. = 1,5 Std.	{14° C. 6° C.	{40,5° C. 40° C.	45 Liter

Futter 25 Gr. Haferschrot und Rüben, soviel es fressen will.

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzirte CO ₂	Hieraus ergeben sich, auf 1 Stunde berechnet, folgende Werthe	
					Ventilation	produzirte CO ₂
für 50 Cemtr. Baryt						
2600 Cemtr.	30,0	23,3	6,7	3,484 Gr.	46,6 Liter	2,3226 Gr.
2600 Cemtr.	29,6	22,5	7,1	3,692 Gr.	44 Liter	2,461 Gr.
2600 Cemtr.	29,6	18,0	11,6	6,032 Gr.	39,5 Liter	3,016 Gr.
2600 Cemtr.	29,6	18,1	11,5	5,98 Gr.	32 Liter	2,99 Gr.
2600 Cemtr.	31,4	21,0	10,4	5,408 Gr.	40 Liter	3,605 Gr.
2600 Cemtr.	30,8	22,6	8,2	4,264 Gr.	40 Liter	2,843 Gr.
2600 Cemtr.	30,8	22,8	8,0	4,16 Gr.	33 Liter	2,773 Gr.
2600 Cemtr.	30,4	20,9	9,5	4,94 Gr.	34 Liter	3,293 Gr.
2600 Cemtr.	30,4	22,5	7,9	4,108 Gr.	32 Liter	2,739 Gr.
2600 Cemtr.	30,0	22,8	7,2	3,744 Gr.	30 Liter	2,496 Gr.

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur im Zimmer ev. im Freien	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Ventilation während des ganzen Versuches
XI. 28./III.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; ist vorher gefüttert	9 ⁴⁹ —11 ¹⁹ Vorm. = 1,5 Std.	{18° C. {4,5° C.	{40° C. {39° C.	45 Liter
XII. 28./III.	Kaninchen unter der Glasglocke im Zimmer; ist vorher gefüttert	4 ¹⁷ —5 ¹⁷ Nachm. = 1 Std.	{15,5° C. {10° C.	{39° C. {39,5° C.	36 Liter
XIII. 29./III.	Desgleichen	2 ³¹ —4 ¹ Nachm. = 1,5 Std.	{16° C. {8° C.	{40° C. {39° C.	51 Liter
XIV. 30./III.	Desgleichen	11 ⁵³ —1 ⁵³ Vorm. = 2 Std.	{16° C. {8° C.	{39,8° C. {39° C.	88 Liter
XV. 1./IV.	Desgleichen	11 ¹⁵ —1 ¹⁵ Vorm. = 2 Std.	{14,5° C. {7° C.	{40° C. {39° C.	75 Liter
XVI. 2./IV.	Desgleichen	10 ¹² —1 ¹² Vorm. = 3 Std.	{14,5° C. {7° C.	{39° C. {39,5° C.	118 Liter
XVII. 3./IV.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; ist vorher gefüttert	8 ³⁶ —11 ³⁶ Vorm. = 3 Std.	{10° C. {3° C.	{40° C. {38° C.	138 Liter
XVIII. 4./IV.	Desgleichen	4 ⁵⁸ —6 ⁵⁸ Vorm. = 2 Std.	{10,5° C. {2° C.	{40° C. {39,5° C.	96 Liter
XIX. 5./IV.	Desgleichen	4 ⁴⁹ —6 ⁴⁹ Vorm. = 2 Std.	{10° C. {4° C.	{40° C. {39,8° C.	92 Liter

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzierte CO ₂	Hieraus ergeben sich, auf 1 Stunde berechnet, folgende Werthe	
					Ventilation	produzierte CO ₂
2600 Cemtr.	30,0	21,6	8,4	4,368 Gr.	30 Liter	2,912 Gr.
600 Cemtr.	32,4	22,7	9,7	3,104 Gr.	36 Liter	3,104 Gr.
600 Cemtr.	29,6	21,1	8,5	4,42 Gr.	34 Liter	2,946 Gr.
500 Cemtr.	27,2	18,4	8,8	6,16 Gr.	44 Liter	3,08 Gr.
500 Cemtr.	21,6	13,2	8,4	5,88 Gr.	37,5 Liter	2,94 Gr.
600 Cemtr.	21,6	8,7	12,9	9,288 Gr.	39,3 Liter	3,096 Gr.
600 Cemtr.	21,6	9,6	12,0	8,64 Gr.	46 Liter	2,88 Gr.
400 Cemtr.	21,6	15,0	6,6	5,808 Gr.	48 Liter	2,904 Gr.
000 Cemtr.	21,6	13,7	7,9	6,32 Gr.	46 Liter	3,16 Gr.

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur im Zimmer ev. im Freien	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Ventilation während des ganzen Versuches
XX. 8./IV.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; erhält täglich 150 Gr. Futter	3 ³⁰ —5 ³⁰ Nachm. = 2 Std.	{14,5 °C. 13 °C.	{39,5 °C. 39,5 °C.	100 Liter
XXI. 12./IV.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; Futter 150 Gr. Rüben	9 ⁴⁶ —11 ⁴⁶ Vorm. = 2 Std.	{14 °C. 7,5 °C.	{39,5 °C. 39,5 °C.	135 Liter
XXII. 13./IV.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; hat seit 1 Tag kein Futter erhalten. Gew. 2180 Gr.	11 ¹⁵ —1 ¹⁵ Vorm. = 2 Std.	{13 °C. 15—21 °C. Schatt. Sonne	{39 °C. 42 °C.	128 Liter
XXIII. 15./IV.	Desgleichen	9 ⁴⁶ —11 ⁴⁶ Vorm. = 2 Std.	{12 °C. 10,5 °C.	{39 °C. 39,8 °C.	112 Liter
XXIV. 17./IV.	Desgleichen	3 ³⁰ —5 ³⁰ Nachm. = 2 Std.	{15 °C. 10 °C.	{39,5 °C. 40,2 °C.	120 Liter
XXV. 25./IV.	Desgleichen	1 ³⁶ —3 ³⁶ Nachm. = 2 Std.	{16 °C. 9 °C.	{40 °C. 39 °C.	117 Liter
XXVI. 26./IV.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; hat seit 2 Tagen kein Futter erhalten.	2 ¹⁵ —4 ¹⁵ Nachm. = 2 Std.	{13 °C. 10 °C.	{39 °C. 39 °C.	76 Liter
XXVII. 30./IV.	Desgleichen Gew. 1600 Gr.	10 ⁴ —12 ⁴ Vorm. = 2 Std.	{16 °C. 23,5 °C.	{38 °C. 44 °C.	101 Liter

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzirte CO ₂	Hieraus ergeben sich, auf 1 Stunde berechnet, folgende Werthe	
	für 50 Cemtr. Baryt				Ventilation	produzirte CO ₂
4000 Cemtr.	26,4	18,5	7,9	6,32 Gr.	50 Liter	3,16 Gr.
4400 Cemtr.	26,4	20,4	6,0	5,28 Gr.	67,5 Liter	2,64 Gr.
4000 Cemtr.	26,4	19,7	6,7	5,36 Gr.	64 Liter	2,68 Gr.
4000 Cemtr.	26,4	20,2	6,2	4,96 Gr.	56 Liter	2,48 Gr.
4000 Cemtr.	26,4	20,1	6,3	5,04 Gr.	60 Liter	2,52 Gr.
4000 Cemtr.	26,3	20,2	6,1	4,88 Gr.	58,5 Liter	2,44 Gr.
4000 Cemtr.	22,5	16,5	6,0	4,8 Gr.	38 Liter	2,4 Gr.
4000 Cemtr.	22,5	16,4	6,1	4,88 Gr.	50,5 Liter	2,44 Gr.

Wenden wir uns nun zu der ersten Abtheilung dieser Versuche, welche uns die Kohlensäureabscheidung bei den verschiedenen Temperaturen zeigen. Dieselben geben, nach den einzelnen Temperaturgraden geordnet, folgende Reihe — die CO₂ auf 1 Stunde berechnet:

Temperaturversuche.

Lauf. Nr.	Nr. des Versuches	Aussen-temperatur	Temp. der Thiere vor u. nach d. Versuche	Produzirte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet	
		° C.	° C.	Gr.	
1	XVIII	2	{ 40 39,5	2,904	} Grenzwerte: 2,739—3,605 Gr.
2	XVII	3	{ 40 38	2,88	
3	XIX	4,5	{ 40 39,8	3,16	
4	XI	4,5	{ 40 39	2,912	
5	XIX	6	{ 40 39	2,739	} Mittelwerth: 3,055 Gr.
6	VIII	7	{ 40 39	3,293	
7	III	10,2	{ 40 39	3,016	} Mittelwerth pro Kilogr. Thier: 1,27 Gr.
8	V	10,2	{ 40 40	3,605	
9	IV	10,3	{ 40 40	2,99	
10	VI	10,3	{ 40 40,5	2,843	
11	VII	12	{ 40 39,5	2,773	} Grenzwerte: 2,461—2,843 Gr.
12	I	12,5	{ 40 40	2,3226	
13	II	12,5	{ 40 39,8	2,461	} Mittelwerth pro Kilogr. Thier: 1,07 Gr.
14	X	14	{ 40,5 40	2,496	
15	XV	14,5	{ 40 39	2,94	} Grenzwerte: 2,94—3,104 Gr.
16	XVI	14,5	{ 39 39	3,096	
17	XII	15,5	{ 39 39,5	3,104	} Mittelwerth: 3,033 Gr.
18	XIII	16	{ 40 39	2,946	
19	XIV	16	{ 39,8 39	3,08	} Mittelwerth pro Kilogr. Thier: 1,26 Gr.

Es tritt uns aus diesen Versuchen für Temperaturen von $10,5^{\circ}\text{C.}$ — 14°C. eine ziemlich gleichmässige CO_2 -Abscheidung entgegen, während ein Fallen und ein Steigen der umgebenden Temperatur eine gewisse Steigerung in der Produktion der Kohlensäure ergibt. Man kann daher wohl die Temperatur von $10,5^{\circ}\text{C.}$ bis 14°C. als die der Natur des Kaninchens am besten entsprechende betrachten. Die Eigentemperatur des Thieres blieb bei diesen sämtlichen Versuchen ziemlich konstant, und waren keine sonderlichen Schwankungen zu verzeichnen. — Die vermehrte Kohlensäureabscheidung beim Sinken der Temperatur ist leicht erklärlich; denn, um die Eigenwärme zu erhalten, nehmen hierbei durch reflektorische Anregung die Oxydationsprozesse im Körper und damit auch die Zahl und die Tiefe der Athemzüge zu, so dass mehr Sauerstoff eingenommen und mehr Kohlensäure abgegeben wird. — Das Resultat, dass bei steigender Lufttemperatur die CO_2 -Abscheidung ebenfalls zunimmt, findet wohl darin seine Erklärung, dass hierbei auch eine Steigerung der Eigenwärme stattfindet; was freilich durch die am Thiere vorgenommenen Messungen nicht in sehr deutlicher Weise nachzuweisen war. — Wie aus der letzten Tabelle hervorgeht, können gelegentlich höhere Werthe auch in die Normaltemperatur von $10,5^{\circ}\text{C.}$ — 14°C. fallen, wie auch anderseits niedrige Resultate in die höheren und niederen Temperaturen fallen. Sobald man aber die Gesamtzahl der einzelnen Versuche in jeder Gruppe und deren Mittelwerthe ins Auge fasst, ergibt sich schlagend das Obengesagte. —

Der zweite Theil meiner Versuche nun sollte nachweisen, wie sich die Schwankungen der CO_2 -Abscheidung in den verschiedenen Stadien der Verdauung kund gäben, wie sie sich beim Hungerzustande, wie im Stadium der Anfütterung verhielten.

Das Kaninchen A wurde vom XX. Versuche an durch kleinere Futterrationen und durch eingelegte Hungertage

in seinem Ernährungszustand allmählich reduziert, so dass im Verlaufe von 25 Tagen eine Gewichtsabnahme von rund 2400 Gr. bis auf 1600 Gr. statthatte.

Ich stelle im Folgenden diese modifizirten Hungerversuche in derselben Reihenfolge, wie sie ausgeführt wurden, zusammen:

Hungerversuche.

Lauf. Nr.	Nr. des Versuches	Aussen-temperatur	Temp. der Thiere vor u. nach d. Versuche	Fütterung	Produzirte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet
1	XX	° C. 13	{39,5 39,5	Futter 150 Gr. Rüben	3,16 Gr. pro St.
2	XXI	7,5	{39,5 39,5	Futter 150 Gr. Rüben	2,64 " " "
3	XXII	15— 21	{39 42	kein Futter seit 1 Tag	2,68 " " "
4	XXIII	10,5	{39 39,8	kein Futter seit 1 Tag	2,48 " " "
5	XXIV	10	{39,5 40,2	kein Futter seit 1 Tag	2,52 " " "
6	XXV	9	{40 39	kein Futter seit 1 Tag	2,44 " " "
7	XXVI	10	{39 39	kein Futter seit 2 Tagen	2,4 " " "
8	XXVII	23,5	{38 44	kein Futter seit 2 Tagen	2,44 " " "

Grenzwerte: 2,68—2,4 Gr.

Mittelwerth: 2,46 Gr.

Die Reihe der gefundenen CO₂-Werthe zeigt ein zwar schwaches, aber beständiges Sinken von 3,16 bis 2,4 Gr. stündlich produzierter Kohlensäure. — Abgesehen von Versuch 8 weicht die Temperatur des Kaninchens bei diesen

Versuchen nicht beträchtlich von der als Durchschnittstemperatur des Kaninchens anzusehenden ab; auch die Kohlensäurewerthe differiren nur um ein Geringes von den früher gefundenen Durchschnittswerthen für diese Temperaturen. Offenbar hielten sich trotz der zeitweisen Nahrungsentziehung auch jetzt die physiologischen Vorgänge im Thiere annähernd auf derselben Höhe, wie bei normaler Ernährung und das Thier musste mangels zugeführten Materials von seiner eigenen Körpersubstanz verbrennen. So finden die angegebenen CO_2 -Werthe ihre Erklärung in der hohen Gewichtsabnahme, welche das Thier während dieser Zeit erlitten hat. — Leider ging dieses Thier bei dem letzten Versuche zu Grunde, wahrscheinlich in Folge von Sonnenstich. (Bei diesem Versuche wurde die Glocke, unter welcher sich das Thier befand, intensiv von der Sonne beschienen. — Die Temperatur des Thieres stieg um 6°C.).

Zu den weiteren Versuchen bediente ich mich nun eines zweiten Kaninchens B, welches rund 2500 Gr. wog. Ich lasse die mit diesem vorgenommenen Versuche in historischer Reihenfolge folgen.

Kaninchen B wiegt

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur im Zimmer ev. im Freien	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Ventilation während des ganzen Versuches
XXVIII. 4./V.	Kaninchen unter der Glasglocke im Freien; ist vorher gefüttert	10 ⁹ —12 ⁹ Vorm. = 2 Std.	{18,2 °C. {24 °C.	{39,8 °C. {40,8 °C.	97 Liter

Zu den weiteren Versuchen bediente ich mich des

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventilationsfaktor f(V) = $\frac{Vs}{va}$
XXIX. 17./V.	Kaninchen; am Versuchstage kein Futter	10 ³² —2 ³ Vorm. = 3,5166 St.	19,5 °C.	{39,5 °C. {40 °C.	172,86 Liter = 12,26 + 160,6	14,09951
XXX. 18./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	9 ⁵⁰ —12 ⁵⁵ Vorm. = 3,083 St.	20 °C.	{39,5 °C. {39,8 °C.	187,26 Liter = 12,26 + 175	15,27
XXXI. 19./V.	Kaninchen; am Versuchstage kein Futter	11 ⁴⁵ —2 ⁴⁵ Vorm. = 3 St.	15,7 °C.	{39 °C. {39 °C.	130,76 Liter = 12,26 + 118,5	10,66606
XXXII. 20./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	11 ³⁸ —2 ⁴³ Vorm. = 3,0833 St.	18,5 °C.	{39,1 °C. {39,8 °C.	182,26 Liter = 12,26 + 170	14,866
XXXIII. 22./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	12 ¹² —3 ⁵⁹ Vorm. = 3,7833 St.	20,5 °C.	{39,5 °C. {39,5 °C.	214,76 Liter = 12,26 + 202,5	17,51
XXXIV. 23./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	12 ¹⁶ —3 ¹⁶ Vorm. = 3 St.	22,5 °C.	{40 °C. {40 °C.	174,06 Liter = 12,26 + 161,8	14,1973

rund 2500 Gr.

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	VomThiere produzirte CO ₂	Hieraus ergeben sich, auf 1 Stunde berechnet, folgende Werthe	
	für 50 Cemtr. Baryt				Ventilation	produzirte CO ₂
1000 Cemtr.	22,5	15,9	6,6	5,28 Gr.	48,5 Liter	2,64 Gr.

zweiten der vorher beschriebenen Apparate.

An- fangs- titer	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzirte CO ₂	Produzirte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
für 50 Cemtr. Baryt							
30,5	25,8	4,7	0,47 Gr.	6,6267697Gr.	0,13416 Gr.	6,4926097Gr.	1,846 Gr.
30,5	25	5,5	0,55 Gr.	8,3985 Gr.	0,14586 Gr.	8,25264 Gr.	2,675 Gr.
30,5	25,0	5,5	0,55 Gr.	5,866333 Gr.	0,1014 Gr.	5,71253 Gr.	1,904 Gr.
30,5	24,7	5,8	0,58 Gr.	8,62228 Gr.	0,14196 Gr.	8,48032 Gr.	2,75 Gr.
30,5	25,0	5,5	0,55 Gr.	9,6305 Gr.	0,16692 Gr.	9,46358 Gr.	2,501 Gr.
30,5	25,0	5,5	0,55 Gr.	7,808515 Gr.	0,13572 Gr.	7,672795 Gr.	2,557 Gr.

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventila-tions-faktor $f(V) = \frac{V_s}{v_a}$
XXXV. 24./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	1 ¹⁴ —4 ⁴³ Nachm. = 3,65 St.	23 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	193,26 Liter = 12,26 + 181	15,76
XXXVI. 25./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	8 ³³ —1 ⁵⁹ Vorm. = 5,433 St.	22 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	309,66 Liter = 12,26 + 297,4	25,25
XXXVII. 29./V.	Kaninchen; Rüben als Futter erhalten	11 ⁵⁸ —4 ³ Nachm. = 4,083 St.	21,5 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	235,26 Liter = 12,26 + 223	19,07
XXXVIII. 31./V.	Kaninchen. II. Hungertag	11 ³⁶ —3 ¹⁰ Vorm. = 3,566 St.	23,5 ° C.	{ 39,5 ° C. 39 ° C.	199,76 Liter = 12,26 + 187,5	16,29
XXXIX. 1./VI.	Kaninchen. III. Hungertag	8 ³⁰ —11 ³⁶ Vorm. = 3,1 St.	24 ° C.	{ 39 ° C. 39 ° C.	166,26 Liter = 12,26 + 154	13,52
XL. 2./VI.	Kaninchen. IV. Hungertag	10 ¹⁷ —2 ⁴⁴ Vorm. = 4,45 St.	26,5 ° C.	{ 39 5 ° C. 39 ° C.	228,26 Liter = 12,26 + 216	18,5856
XLI. 3./VI.	Kaninchen. V. Hungertag	11—3 ¹⁷ Vorm. = 4,2833 St.	25 ° C.	{ 38,5 ° C. 38,5 ° C.	212,26 Liter = 12,26 + 200	17,31
XLII. 4./VI.	Kaninchen. VI. Hungertag	8 ²⁴ —12 ¹⁴ Vorm. = 3,833 St.	25 ° C.	{ 38,5 ° C. 38,5 ° C.	217,26 Liter = 12,26 + 205	17,72
XLIII. 5./VI.	VII. Hungertag. Kaninchen †. Gewicht: 1670 Gr.	10 ⁴⁹ —1 ³¹ Vorm. = 2,7 St.	23,5 ° C.	37 ° C	129,286 Liter = 9,286 + 120	13,92

Anfangs- titer für 50 Cemtr.	End- titer	Diffe- renz Baryt	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamnten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
30,5	24,3	6 2	0,62 Gr.	9,7712 Gr.	0,15054 Gr.	9,62066 Gr.	2,635 Gr.
30,5	23,9	6,6	0,66 Gr.	16,665 Gr.	0,24102 Gr.	16,30038 Gr.	3,0 Gr.
30,5	24,3	6,2	0,62 Gr.	11,8234 Gr.	0,1833 Gr.	11,6401 Gr.	2,85 Gr.
30,5	26,5	4,0	0,4 Gr.	6,516 Gr.	0,15222 Gr.	6,36318 Gr.	1,784 Gr.
30,5	26,0	4,5	0,45 Gr.	6,084 Gr.	0,12948 Gr.	5,95452 Gr.	1,920 Gr.
30,5	26,0	4,5	0,45 Gr.	8,36352 Gr.	0,17736 Gr.	8,19616 Gr.	1,841 Gr.
30,5	26,4	4,1	0,41 Gr.	7,0971 Gr.	0,16536 Gr.	6,93174 Gr.	1,618 Gr.
30,5	26,8	3,7	0,37 Gr.	6,5564 Gr.	0,16926 Gr.	6,38714 Gr.	1,664 Gr.
30,5	27,3	3,2	0,32 Gr.	4,4544 Gr.	1,0062 Gr.	4,35378 Gr.	1,612 Gr.

Zuerst suchte ich auch bei diesem Thiere durch abwechselnde reichliche Fütterung und vollkommene Futterentziehung festzustellen, ob das bis dahin mit anderen Kaninchen zusammen im Stalle ernährte Thier Schwankungen in seiner CO_2 -Produktion zeigen würde und fand in der That grössere Differenzen, als sie die letzten Versuche mit dem zuvor verwendeten Thiere ergeben hatten.

Modifizierte Hungerversuche.

Lauf.Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thiers vor u. nach d. Versuche	Fütterung	Produzirte CO_2 auf 1 Stunde berechnet
1	XXVIII	$^{\circ}\text{C.}$ 24	$^{\circ}\text{C.}$ {39,8 40,8	Futter erhalten	2,64 Gr. pro St.
2	XXIX	19,5	{39,5 40	kein Futter am Versuchstage	1,846 " " "
3	XXX	20	{39,5 39,8	Futter erhalten	2,675 " " "
4	XXXI	15,7	{39 39	kein Futter am Versuchstage	1,904 " " "

Alsdann stellte ich zuerst bei ausreichender Fütterung die bei der gerade obwaltenden Temperatur — $18,5^{\circ}\text{C.}$ — 23°C. , im Mittel 21°C. — durchschnittlich von dem Thiere produzierte Kohlensäure fest und fand auf Grund der Versuche XXXII bis XXXVII folgenden Mittelwerth:

Versuche mit reichlicher Fütterung.

Lauf.Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thiers vor u. nach d. Versuche	Producirte CO_2 auf 1 Stunde berechnet	
1	XXXII	$^{\circ}\text{C.}$ 18,5	$^{\circ}\text{C.}$ {39,1 39,8	Gr. pro St. 2,75	} Grenzwerte: 3—2,501 Gr.
2	XXXIII	20,5	{39,5 39,5	2,501	
3	XXXIV	22,5	{40 40	2,557	} Mittelwerth: 2,713 Gr.
4	XXXV	23	{40 40	2,635	
5	XXXVI	22	{40 40	3,0	} Mittelwerth pr. Kilogr. Thier: 1,04 Gr. CO_2 .
6	XXXVII	21,5	{40 40	2,85	

Hieran schloss ich eine Reihe von Hungerversuchen, in der Absicht, dem Thiere acht Tage das Futter zu entziehen, um es dann wieder zu seinem früheren Ernährungszustand aufzufüttern. Letzteres wurde durch den am siebenten Hungertage eintretenden Tod des Thieres vereitelt.

Die bei diesen sechs Versuchen XXXVIII—XLIII gefundenen Resultate geben folgende Reihe:

Lauf Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thiers vor u. nach d. Versuche	Fütterung	Produzirte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet
1	XXXVIII	° C. 23,5	° C. {39,5 39	II. Hungertag	1,784 Gr. pr. St.
2	XXXIX	24	{39 39	III. "	1,92 " " "
3	XL	26,5	{39,5 39	IV. "	1,841 " " "
4	XLI	25	{38,5 38,5	V. "	1,618 " " "
5	XLII	25	{38,5 38,5	VI. "	1,664 " " "
6	XLIII	23,5	37	VII. "	1,612 " " "

Am ersten Hungertage war ich verhindert, einen Versuch anzustellen, und ist somit der erste Versuch dieser Reihe erst am zweiten Hungertage gemacht. Hieraus erklärt sich wohl der plötzliche Abfall der CO₂-Abscheidung gegenüber den vorherstehenden Versuchen. In der ganzen Reihe nun selbst tritt uns ein allmähliches, aber merkliches Absteigen der Kohlensäureabscheidung entgegen, welches aber an den letzten Hungertagen einer gleichmässigen niedrigen CO₂-Produktion Platz macht; zugleich war auch ein sichtliches Fallen der Eigentemperatur zu beobachten. Beide Beobachtungen finden vollständig ihre Erklärung in dem Vorhergesagten.

Um nunmehr die durch den Tod des zweiten Kaninchens B unterbrochenen Beobachtungen weiter fortzusetzen, bediente ich mich eines dritten Kaninchens C und stellte mit demselben folgende sechsundzwanzig Versuche an:

Kaninchen C wiegt

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventila-tions-faktor $f(V) = \frac{V_s}{V_a}$
XLIV. *) 16./VI.	Kaninchen; schlecht er- nährt. Gew. 1880 Gr.	11 ⁵⁵ —3 ²⁶ Vorm. = 3,5166 St.	21 ° C.	{ 39,5 ° C. 39 ° C.	172,26 Liter = 12,26 + 160	14,05
XLV. 16./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kohl- rabi	4 ¹⁷ —7 ³⁸ Nachm. = 3,35 St.	21 ° C.	{ 39 ° C. 39 ° C.	173,26 Liter = 12,26 + 161	14,13
XLVI. 17./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kohl- rabi	12—3 ¹⁵ Vorm. = 3,25 St.	20 ° C.	{ 39,3 ° C. 40,1 ° C.	166,26 Liter = 12,26 + 154	13,56
XLVII. 17./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kohl- rabi	3 ³⁸ —7 ¹² Nachm. = 3,566 St.	21 ° C.	{ 40,1 ° C. 40 ° C.	192,76 Liter = 12,26 + 180,5	15,72
XLVIII. 18./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kraut und Kohlrabi	11 ⁴⁹ —3 ¹³ Vorm. = 3,4 St.	22 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	197,26 Liter = 12,26 + 185	16,089
XLIX. 18./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kraut und Kohlrabi	4—8 ²⁸ Nachm. = 4,4666 St.	22,5 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	226,26 Liter = 12,26 + 214	18,45
L. 19./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kraut und Kohlrabi	8 ⁶ —10 ⁶ Vorm. = 2 St.	22 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	116,26 Liter = 12,26 + 104	9,4828
LI. 20./VI.	Kaninchen er- hält in den Apparat Kohl- rabi	5—8 ⁸ Nachm. = 3,133 St.	24 ° C.	{ 40 ° C. 40 ° C.	170,26 Liter = 12,26 + 168	13,887

*) Die verhältnissmässig niedrige CO₂-Abscheidung bei diesem Versuche kurz vor dem Versuche dem Stalle entnommen war, wo es seit mindestens

rund 1880 Gr.

Anfangs- titer für 50 Ccmtr. Baryt	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamnten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
30,5	25,1	5,4	0,54 Gr.	7,587 Gr.	0,13416 Gr.	7,45284 Gr.	2,11 Gr.
30,5	23,5	7,0	0,7 Gr.	9,891 Gr.	0,13494 Gr.	9,75609 Gr.	2,912 Gr.
30,5	23,1	7,4	0,74 Gr.	10,0344 Gr.	0,12928 Gr.	9,90512 Gr.	3,047 Gr.
30,5	22,2	8,3	0,83 Gr.	13,0496 Gr.	0,1404 Gr.	12,9092 Gr.	3,619 Gr.
30,5	22,5	8,0	0,8 Gr.	12,8712 Gr.	0,15366 Gr.	12,71754 Gr.	3,74 Gr.
30,5	19,5	11,0	1,1 Gr.	20,295 Gr.	0,17628 Gr.	20,11872 Gr.	4,504 Gr.
30,4	23,2	7,2	0,72 Gr.	6,827616 Gr.	0,09048 Gr.	3,368568 Gr.	3,368 Gr.
30,4	21,9	8,5	0,85 Gr.	11,80395 Gr.	0,1326 Gr.	11,67135 Gr.	3,72 Gr.

gegenüber den nun folgenden, hat wohl darin seinen Grund, dass das Kaninchen dem letzten Tage kein oder doch sehr wenig Futter erhalten hatte.

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventila-tions-faktor $f(V) = \frac{V_s}{v_a}$
LII. 21./VI.	Kaninchen erhält in den Apparat Kohlrabi u. Rüben	8 ³⁷ —11 ³⁷ Vorm. = 3 St.	22 °C.	{40 °C. {40 °C.	190,26 Liter = 12,26 + 178	15,518
LIII. 21./VI.	Kaninchen erhält in den Apparat fünf Kohlrabi	3 ⁴⁰ —6 ¹² Nachm. = 2,533 St.	22,5 °C.	{40 °C. {40 °C.	137,26 Liter = 12,26 + 125	11,19
LIV. 21./VI.	Kaninchen erhält in den Apparat kein Futter	7 ⁵⁵ —10 ⁵⁵ Abends = 3 St.	24 °C.	{40 °C. {39 °C.	189,26 Liter = 12,26 + 177	15,43
LV. 21./VI.	Kaninchen erhält in den Apparat Kohlrabi	11 ²² —3 ⁴⁷ Nachts = 4,4160 St.	23 °C.	{39 °C. {39,8 °C.	247,26 Liter = 12,26 + 235	20,16
LVI. 22./VI.	Kaninchen erhält in den Apparat Kohlrabi Gew. 2127 Gr.	4 ³⁵ —7 ¹³ Mittags = 2,66 St.	22 °C.	{39,8 °C. {40 °C.	171,26 Liter = 12,26 + 159	13,93
LVII. 23./VI.	I. Hungertag Gew. 1980 Gr.	3 ³⁵ —6 ³⁵ Nachm. = 3 St.	22 °C.	{39 °C. {39 °C.	164,26 Liter = 12,26 + 152	13,39
LVIII. 24./VI.	II. Hungertag Gew. 1940 Gr.	1 ²³ —4 ⁴⁰ Nachm. = 3,283 St.	22 °C.	{39 °C. {39 °C.	180,26 Liter = 12,26 + 168	14,70
LIX. 25./VI.	III. Hungertag Gew. 1780 Gr.	11 ²⁵ —2 ²⁵ Vorm. = 3 St.	20,5 °C.	{39 °C. {39 °C.	246,26 Liter = 12,26 + 234	20,08
LX. 26./VI.	IV. Hungertag Gew. 1650 Gr.	10 ²⁶ —2 ¹⁴ Vorm. = 3,8 St.	{22 °C. {26,1 °C.	{38 °C. {38 °C.	224,26 Liter = 12,26 + 212	18,25
LXI. 27./VI.	V. Hungertag Gew. 1400 Gr. Nach dem Versuche sofort 30 Cemtr. Brod in Milch u. Salat	11 ⁵⁰ —3 ¹⁵ Vorm. = 3,4166 St.	24 °C.	{37,5 °C. {37 °C.	175,26 Liter = 12,26 + 163	14,29

Anfangs- titer für 50 Ccmtr.	End- titer	Diffe- renz Baryt	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
30,4	22,9	7,5	0,75 Gr.	11,6375 Gr.	0,1482 Gr.	11,4893 Gr.	3,829 Gr.
30,4	21,5	8,9	0,89 Gr.	9,9591 Gr.	0,10686 Gr.	9,85224 Gr.	3,88 Gr.
30,4	23,9	6,5	0,65 Gr.	10,0295 Gr.	0,14742 Gr.	9,88208 Gr.	3,294 Gr.
30,4	21,1	9,3	0,93 Gr.	18,7488 Gr.	0,19266 Gr.	18,55614 Gr.	4,2 Gr.
30,4	21,9	8,5	0,85 Gr.	11,7405 Gr.	0,13338 Gr.	11,60712 Gr.	4,36 Gr.
30,4	23,9	6,5	0,65 Gr.	8,7035 Gr.	0,12792 Gr.	8,57558 Gr.	2,858 Gr.
30,4	24,0	6,4	0,64 Gr.	9,408 Gr.	0,1404 Gr.	9,2676 Gr.	2,82 Gr.
30,4	26,5	3,9	0,39 Gr.	7,8312 Gr.	0,20188 Gr.	7,62932 Gr.	2,543 Gr.
30,4	26,1	4,3	0,43 Gr.	7,8475 Gr.	0,17472 Gr.	7,67278 Gr.	2,019 Gr.
30,4	26,1	4,3	0,43 Gr.	6,1447 Gr.	0,1365 Gr.	6,0082 Gr.	1,75 Gr.

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung.	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Tempera- tur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt- ventilat. V_s aus Aspira- torventilat. v_a u. Pumpen- ventilat. v_g	Ventila- tions- faktor $f(V) = \frac{V_s}{v_a}$
LXII. 28./VI.	I. Anfüt- terungstag Gew. 1340 Gr. Kaninchen hat wenig ge- fressen	3 ¹ —6 ⁷ Nachm. = 3,1 St.	23 ° C.	36 ° C. 37,5 ° C.	182,26 Liter = 12,26 + 170	14,86
LXIII. 29./VI.	II. Anfüt- terungstag Gew. 1288 Gr. Kaninchen hat wenig ge- fressen	9 ²³ —12 ²⁹ Vorm. = 3,1 St.	21 ° C.	35 ° C. 34 ° C.	201,26 Liter = 12,26 + 189	16,41
LXIV. 30./VI.	III. Anfüt- terungstag Gew. 1266 Gr. Kaninchen hat 2 Kohlrabi ge- fressen	12 ⁴⁴ —3 ⁴⁴ Vorm. = 3 St.	22,5 ° C.	36 ° C. 36 ° C.	165,26 Liter = 12,26 + 153	13,47
LXV. 1./VII.	IV. Anfüt- terungstag Gew. 1345 Gr. Kaninchen frisst von jetzt ab reichlicher	11 ⁵ —2 ⁵⁵ Vorm. = 3,833 St.	21 ° C.	37 ° C. 37 ° C.	216,26 Liter = 12,26 + 204	17,63
LXVI. 2./VII.	V. Anfüt- terungstag Gew. 1408 Gr.	9 ² —11 ³² Vorm. = 2,5 St.	19,5 ° C.	38, ° C. 38, ° C.	154 26 Liter = 12,26 + 142	12,58
LXVII. 3./VII.	VI. Anfüt- terungstag Gew. 1615 Gr.	10 ³⁶ —1 ³⁹ Vorm. = 3,05 St.	19 ° C.	39 ° C. 39 ° C.	174,26 Liter = 12,26 + 162	14,21
LXVIII. 4./VII.	VII. Anfüt- terungstag Gew. 1765 Gr.	7 ⁶ —9 ⁹ Vorm. = 2,05 St.	21,5 ° C.	39,5 ° C. 39,5 ° C.	134,26 Liter = 12,26 + 122	10,95
LXIX. 5./VII.	VIII. Anfüt- terungstag Gew. 1872 Gr.	6 ¹⁸ —8 ⁴⁰ Vorm. = 2,36 St.	20 ° C.	39, ° C. 39 ° C.	144,26 Liter = 12,26 + 132	11,76

Anfangs- titer für 50 Cemtr.	End- titer Baryt	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
38,8	34,8	4	0,4 Gr.	5,944 Gr.	0,14196 Gr.	5,80204 Gr.	1,871 Gr.
38,8	35,3	3,5	0,35 Gr.	5,7435 Gr.	0,15678 Gr.	5,58672 Gr.	1,802 Gr.
38,8	34,0	4,8	0,48 Gr.	6,4656 Gr.	0,1287 Gr.	6,3369 Gr.	2,112 Gr.
38,8	34,0	4,8	0,48 Gr.	8,4624 Gr.	0,16848 Gr.	8,29392 Gr.	2,163 Gr.
38,8	34,4	4,4	0,44 Gr.	5,5352 Gr.	0,12012 Gr.	5,41508 Gr.	2,166 Gr.
36,7	31,1	5,7	0,57 Gr.	8,0997 Gr.	0,13572 Gr.	7,93398 Gr.	2,6 Gr.
36,7	31,7	5,0	0,5 Gr.	5,475 Gr.	0,10452 Gr.	5,37098 Gr.	2,63 Gr.
36,7	31,6	5,1	0,51 Gr.	5,9976 Gr.	0,11232 Gr.	5,88528 Gr.	2,49 Gr.

Da das Kaninchen, als ich es bekam, in schlechtem Ernährungszustand war, was ja auch der schon erwähnte Vorversuch XLIV durch eine verhältnissmässig niedrige CO_2 -Abscheidung dokumentirte, modifizierte ich die darauf folgenden Versuche dahin, dass das Thier überreichliches frisches Futter (Salat und junge Kohlrabi) und zwar im Apparat selbst während der Versuche erhielt. Das Resultat war eine durchweg hohe CO_2 -Abscheidung (bei gleichzeitiger Konstanz der Körpertemperatur) und eine Gewichtszunahme um rund 250 Gr.

Aus nachstehender Reihe ergeben sich die betreffenden Grenz- und Mittelwerthe. — Versuch 10 (LIV) dieser Reihe verdient insofern Beachtung, als ich hierbei dem Thiere das Futter im Apparate vorenthielt; es macht sich eine merklich verminderte CO_2 -Abscheidung gegenüber dem kurz zuvor und kurz nachher angestellten Versuche bemerkbar.

Versuche mit überreichlichem Futter im Apparat.

Lauf. Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thiers vor u. nach d. Versuche	Produzirte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet	
1	XLV	° C. 21	° C. {39 39	Gr. pr. St. 2,912	Grenzwerthe: 2,912—4,504 Gr.
2	XLVI	20	{39,3 40,1	3,047	
3	XLVII	21	{40 40	3,619	
4	XLVIII	22	{40 40	3,74	
5	XLIX	22,5	{40 40	4,504	Mittelwerth: 3,706 Gr.
6	L	22	{40 40	3,368	
7	LI	24	{40 40*	3,72	
8	LII	22	{40 40	3,829	
9	LIII	22,5	{40 40	3,88	Mittelwerth pro Kilogr. Thier (als Durchschnitts- gewicht 2000 Gr. angenommen) = 1,853 Gr.
*10	LIV	24	{40 39	3,294	
11	LV	23	{39 39,8	4,2	
12	LVI	22	{39,8 40	4,36	

Die hierauf folgenden Hungerversuche brach ich nach den Erfahrungen mit dem Kaninchen B, welches am siebenten Tage starb, am Ende des fünften Tages ab und

versuchte nun das Thier allmählich wieder auf seinen früheren Ernährungszustand zu bringen. Die hieran sich anschliessende Versuchsreihe zeigt die Resultate:

Hungerversuche.

Lauf. Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thiers vor u. nach d. Versuche	Fütterung	Produzirte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet	Gewicht des Thieres
		°C.	°C.		Gr. pr. St.	Gr.
1	LVII	22	{39	I. Hungertag	2,858	1980
			{39			
2	LVIII	22	{39	II. "	2,82	1940
			{39			
3	LIX	20,5	{39	III. "	2,543	1780
			{39			
4	LX	22—	{38	IV. "	2,019	1650
		26,1	{38			
5	LXI	24	{37,5	V. "	1,75	1400
			{37			
6	LXII	23	{36	I. Anfütterungstag	1,871	1340
			{37,5			
7	LXIII	21	{35	II. "	1,802	1288
			{34			
8	LVIV	22,5	{36	III. "	2,112	1266
			{36			
9	LXV	21	{37	IV. "	2,163	1345
			{37			
10	LXVI	19,5	{38	V. "	2,166	1408
			{38			
11	LXVII	19	{39	VI. "	2,6	1615
			{39			
12	LXVIII	21,5	{39,5	VII. "	2,63	1765
			{39,5			
13	LXIX	20	{39	VIII. "	2,49	1872
			{39			

Die Hungerversuche zeigen ein deutliches Sinken der Kohlensäureabscheidung mit gleichzeitigem Abfall der Körpertemperatur und des Gewichts des Thieres. — Im darauf folgenden Stadium der Anfütterung erhielt das Thier am ersten und zweiten Tag nur wenig Futter, bestehend in frischem Salat, frass aber auch von diesem nur wenig

und machte den Eindruck des Krankseins — dünnflüssiger Koth und häufige Harnentleerung —; auch von der vorgesetzten Milch mit Weissbrod frass es nur wenig. — Die ersten Kohlensäurebestimmungen blieben ungefähr dem am letzten Hungertage gefundenen Werth gleich. Am dritten Tage schien das Thier wieder fresslustiger und nahm von da ab das reichlich vorgelegte Futter gern an. Die Kohlensäure-Mengen stiegen gleichmässig, bis am achten Tage ein Durchschnittswerth von 2,6 Gr. erreicht wurde, ein Werth, welcher innerhalb der bei Versuch XLIV und XLV gefundenen Resultaten liegt und als dem nunmehr erreichten Gewicht des Thieres (= 1872 Gr.) entsprechend angesehen werden konnte. —

Damit brach ich meine Versuche an Kaninchen ab. Es lag im Plan meiner Arbeit, noch den Einfluss der fortschreitenden Verdauung auf die CO_2 -Produktion zu prüfen. Für dahin zielende Versuche erschienen Kaninchen nicht wohl brauchbar, da sie sehr schwer so zu gewöhnen sind, dass sie die ihnen vorgesetzte tägliche Futterration mit einem Male verzehren, und da mithin bei ihnen das Maximum der Verdauung nicht eclatant sich ausprägt. Ich wählte daher für die nunmehr anzustellenden Versuche weisse Ratten und Katzen als Versuchsthiere.

Drei Ratten, deren Körpergewicht zusammen circa 300 Gr. betrug, wurden, nachdem sie täglich mit je 15 Gr. Fleisch, 1 Gr. Fett und Wasser vorgefüttert waren, eine Stunde nach der Fütterung unter die Glasglocke des als dritten erwähnten Apparates gesetzt und im Laufe von vierundzwanzig Stunden zu je drei Stunden sechs Mal auf ihre CO_2 -Produktion geprüft. Am Tage vorher hatte ich einen Probeversuch gemacht, dessen Ergebniss mit den folgenden Werthen übereinstimmte.

Versuche über eine 24stündige Verdauungsperiode bei

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur des Zimmers	Temperatur der Ratten	Absorptionsflüssigkeit
LXX. Vorversuch 20./VI.	Ratten unter der Glasglocke; vorher jede mit 15 Gr. Fleisch und 1 Gr. Fett gefüttert	8 ⁴⁰ —10 ⁵⁵ Vorm. = 2,25 St.	24 ° C.	37,8 ° C. 38,0 ° C. 37,5 ° C.	1200 Cemtr.
LXXI. 21./VI.	I. Verdauungsperiode	8 ¹⁵ —11 ¹⁵ Vorm. = 3 St.	22 ° C.	37,8 ° C. 38,0 ° C. 37,5 ° C.	1200 Cemtr.
LXXII. 21./VI.	II. Verdauungsperiode	12 ¹⁵ —3 ¹⁵ Vorm. = 3 St.	22,5 ° C.	—	1200 Cemtr.
LXXIII. 21./VI.	III. Verdauungsperiode	4 ¹⁵ —7 ¹⁵ Nachm. = 3 St.	23 ° C.	—	1200 Cemtr.
LXXIV. 21./VI.	IV. Verdauungsperiode	8 ¹⁵ —11 ¹⁵ Abends = 3 St.	24 ° C.	—	1200 Cemtr.
LXXV. 22./VI.	V. Verdauungsperiode	12 ¹⁵ —3 ¹⁵ Nachts = 3 St.	23 ° C.	—	1200 Cemtr.
LXXVI. 22./VI.	VI. Verdauungsperiode	4 ¹⁵ —7 ¹⁵ Vorm. = 3 St.	23 ° C.	—	1200 Cemtr.

Leider war es mir unmöglich, die Versuche weiter mit diesen Thieren fortzusetzen; denn in den nächsten Tagen starben dieselben an den Zeichen einer Mercurialintoxication, welche vielleicht dadurch zu erklären ist, dass sich aus dem zum Abschluss der Glasglocke dienenden Quecksilber HG-Dämpfe entwickelten. — Während der Versuche zeigten die Thiere aber nicht die geringsten Symptome einer Krankheit und sind die hierbei gefundenen Resultate, welche ein allmähliches Sinken der CO₂-Abscheidung mit der allmählichen Entfernung von der Fütterungszeit ergeben, für die Beurtheilung des in Frage stehenden Einflusses der Verdauung wohl

rei Ratten, welche zusammen circa 300 Gr. wogen.

Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Von den drei Thieren produzirte CO ₂	Produzirte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet	
für 50 Ccmtr. Baryt					
30,4	21,3	9,1	0,091.24 = 2,184 Gr.	0,97 Gr.	Grenzwerthe: 0,97—0,808 Gr. Mittelwerth auf 1 Stunde: 0,867 Gr. Mittelwerth pro Kilogr. Thier: 2,89 Gr.
30,4	18,5	11,9	0,119.24 = 2,856 Gr.	0,952 Gr.	
30,4	18,5	11,9	0,119.24 = 2,856 Gr.	0,952 Gr.	
30,4	19,2	11,2	0,112.24 = 2,688 Gr.	0,881 Gr.	
30,4	19,6	10,6	0,108.24 = 2,592 Gr.	0,861 Gr.	
30,4	19,8	10,8	0,106.24 = 2,544 Gr.	0,848 Gr.	
30,4	20,3	10,1	0,101.24 = 2,424 Gr.	0,808 Gr.	

zu verwerthen. — Der im Verhältniss zu den Kaninchen gefundene hohe Mittelwerth pro Kilogr. Thier findet in der Erfahrung seine Erklärung, dass die CO₂ - Abscheidung nicht etwa proportional mit dem Körpergewicht wächst, sondern dass im Gegentheil gerade kleinere Thiere im Verhältniss zu grossen relativ mehr Kohlensäure produziren. — Zu den weiteren Versuchen, welche denselben Zweck, wie die mit den Ratten unternommenen haben sollten, benutzte ich Katzen zu Versuchsthieren und fand dabei die in folgenden Tabellen zusammengestellten Resultate:

Katze A (schwarz)

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamtventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpenventilat. vg	Ventilationsfaktor $f(V) = \frac{V_s}{V_a}$
	Apparat II.					
LXXVII. 2./VII.	Katze erhielt 4 Stunden zuvor 125 Gr. Milch und $\frac{1}{2}$ Semmel	4 ³⁸ —6 ³⁸ Nachm. = 2 Std.	20 °C.	39 °C.	138,26 Liter = 12,26 + 126	11,27
LXXVIII. 2./VII.	Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	7 ² —9 ² Nachm. = 2 Std.	20 °C.	39 °C.	145,26 Liter = 12,26 + 133	11,84
LXXIX. 3./VII.	Katze erhielt 1 Stunde zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	3 ³⁴ —6 ³⁴ Nachm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.	224,26 Liter = 12,26 + 212	18,29
LXXX. 4./VII.	Katze erhielt 1 Stunde zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	9 ³⁶ —12 ³⁶ Vorm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.	197,26 Liter = 12,26 + 185	16,08
LXXXI. 4./VII.	Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	1 ³² —4 ³² Nachm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.	198,26 Liter = 12,26 + 186	16,17
LXXXII. 4./VII.	Katze blieb seit dem LXXX. Versuche ohne Futter im Apparat	5 ⁵⁰ —8 ⁵⁰ Vorm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.	200,26 Liter = 12,26 + 188	16,33

wiegt 2550 Gr.

Anfangs- titer	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesamt- strom Vs	CO ₂ in der gesamten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thier produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet
für 50 Ccmr. Baryt							
38,8	32,7	6,1	0,61 Gr.	6,8747 Gr.	0,10764 Gr.	6,76706 Gr.	3,382 Gr.
38,8	30,7	8,1	0,81 Gr.	9,5804 Gr.	0,1131 Gr.	9,4673 Gr.	4,7336 Gr.
36,7	29,7	7,0	0,7 Gr.	13,803 Gr.	0,17372 Gr.	13,62928 Gr.	4,543 Gr.
36,7	29,0	7,7	0,77 Gr.	12,3816 Gr.	0,15366 Gr.	12,22794 Gr.	4,075 Gr.
36,7	25,7	11,0	1,1 Gr.	17,787 Gr.	0,15444 Gr.	17,63236 Gr.	5,877 Gr.
36,7	27,6	9,1	0,91 Gr.	14,8503 Gr.	0,156 Gr.	14,6943 Gr.	4,898 Gr.

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche
LXXXIII. 5./VII	Apparat III. Katze erhielt 12 Stunden zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	9 ⁸ —12 ³ Vorm. = 2,916 St.	20 ° C.	39 ° C.

Nr. des Versuches und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventilationsfaktor $f(V) = \frac{v_s}{v_a}$
LXXXIV. 5./VII.	Apparat II. Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	1 ⁸ —4 ⁴ Nachm. = 2,93 St.	22 ° C.	39 ° C.	189,26 Liter = 12,26 + 177	15,43

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche
LXXXV. 5./VII.	Apparat III. Katze blieb seit dem LXXXIII. Versuche ohne Futter im Apparat	5 ³ —8 ³ Nachm. = 3 St.	23 ° C.	{ 39 ° C. 38,5 ° C.

Gewicht der Katze nach

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
	für 50 Cemtr. Baryt				
1500 Cemtr.	36,7	9,4	27,3	0,273.30 Gr. = 8,190 Gr.	2,809 Gr.

An- fangs- titer	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesammt- strom Vs	CO ₂ in der gesamnten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thiere produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
für 50 Cemtr. Baryt							
36,7	31,3	5,4	0,54 Gr.	8,3322 Gr.	0,14742 Gr.	8,18478 Gr.	2,79 Gr.

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ auf 1 Stunde berechnet
	für 50 Cemtr. Baryt				
500 Cemtr.	36,7	16,1	20,6	0,206.30 Gr. = 6,18 Gr.	2,061 Gr.

len Versuchen: 2270 Gr.

Katze B (grau)

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach den Versuche
	Apparat III.			
LXXXVI. 2./VII.	Katze erhielt 4 Stunden zuvor 125 Gr. Milch und $\frac{1}{2}$ Semmel	3 ⁴⁹ —5 ⁴⁹ Nachm. = 2 Std.	20 °C.	39 °C.
LXXXVII. 2./VII.	Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	7 ² —9 ² Nachm. = 2 Std.	20 °C.	39 °C.
LXXXVIII. 3./VII.	Katze erhielt 1 Stunde zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	3 ³⁴ —6 ³⁴ Nachm. = 3 St.	21 °C.	39 °C.
LXXXIX. 4./VII.	Katze erhielt 1 Stunde zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	9 ³⁶ —12 ³⁶ Vorm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.
XC. 4./VII.	Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	1 ³² —4 ³² Nachm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.
XCI. 4./VII.	Katze blieb seit dem LXXXIX. Versuche ohne Futter im Apparat	5 ⁵⁰ —8 ⁵⁰ Nachm. = 3 Std.	21 °C.	39 °C.

wiegt 2070 Gr.

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzierte CO ₂	Produzierte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
	für 50 Cemtr. Baryt				
1300 Cemtr.	38,8	20,6	18,2	0,182.26 Gr. = 4,732 Gr.	2,366 Gr.
1200 Cemtr.	38,8	22,0	16,8	0,168.24 Gr. = 4,032 Gr.	2,016 Gr.
1350 Cemtr.	36,7	15,0	21,7	0,217.27 Gr. = 5,859 Gr.	1,953 Gr.
1400 Cemtr.	36,7	18,1	18,6	0,186.28 Gr. = 5,208 Gr.	1,736 Gr.
1200 Cemtr.	36,7	15,0	21,7	0,217.24 Gr. = 5,208 Gr.	1,736 Gr.
1400 Cemtr.	36,7	20,6	16,1	0,161.28 Gr. = 4,508 Gr.	1,502 Gr.

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventila-tions-faktor $f(V) = \frac{V_s}{V_a}$
XCII. 5./VII.	Apparat II. Katze erhielt 12 Stunden zuvor 200 Gr. Milch und 1 Semmel	9 ^s —12 ^s Vorm. = 3 Std.	20 ° C.	39 ° C.	197,26 Liter = 12,26 + 185	16,08

Nr. und Tag des Versuches	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuches	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche
XCIH. 5./VII.	Apparat III. Katze blieb seit dem vorigen Versuche ohne Futter im Apparat	1 ^s —4 ^s Nachm. = 3 Std.	22 ° C.	39 ° C.

Nr. des Versuchs und Tag desselben	Thier, Apparat und Fütterung	Tageszeit und Dauer des Versuchs	Temperatur des Zimmers	Temp. des Thieres vor und nach dem Versuche	Gesamt-ventilat. Vs aus Aspiratorventilat. va u. Pumpen-ventilat. vg	Ventila-tions-faktor $f(V) = \frac{V_s}{V_a}$
XCIV. 5./VII.	Apparat II. Katze blieb seit dem XCII. Versuche ohne Futter im Apparat	5 ^s —8 ^s Nachm. = 3 Std.	23 ° C.	{ 39 ° C. 38,5 ° C.	206,26 Liter = 12,26 + 194	16,79

Gewicht der Katze nach

Anfangs- titer	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesammt- strom Vs	CO ₂ in der gesamnten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thiere produzirte CO ₂	Produzirte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
für 50 Cemtr. Baryt							
36,7	33,6	3,1	0,31 Gr.	4,9848 Gr.	0,15366 Gr.	4,83114 Gr.	1,61 Gr.

Absorp- tions- flüssigkeit	Anfangs- titer	Endtiter	Differenz	Vom Thiere produzirte CO ₂	Produzirte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
	für 50 Cemtr. Baryt				
200 Cemtr.	36,7	19,5	17,2	0,172.24 Gr. = 4,528 Gr.	1,509 Gr.

Anfangs- titer	End- titer	Diffe- renz	CO ₂ im Theilstrom va	CO ₂ im Gesammt- strom Va	CO ₂ in der gesamnten zugeleiteten Ventilations- luft	Vom Thiere produzirte CO ₂	Produzirte CO ₂ , auf 1 Stunde berechnet
für 50 Cemtr. Baryt							
36,7	34,0	2,7	0,27 Gr.	4,5233 Gr.	0,15068 Gr.	4,37262 Gr.	1,457 Gr.

den Versuchen 1710 Gr.

Stellen wir uns zuerst die Versuche mit der grauen Katze in der Art zusammen, dass sie eine nach den Stunden einer 24stündigen Verdauungsperiode geordnete Reihe bilden,

Versuche über eine 24stündige Verdauungsperiode bei Katze B.

Lauf Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thieres	Produzirte CO ₂ per Stunde	Zeit seit der Fütterung
Vorversuche		° C.	° C.		
1	LXXXVIII	21	39	1,953 Gr.	2—4te Stunde
2	LXXXVI	20	39	2,366 Gr.	4—6te "
3	LXXXVII	20	39	2,016 Gr.	8—10te "
Versuche					
1	LXXXIX	21	39	1,736 Gr.	2—4te "
2	XC	21	39	1,736 Gr.	6—8te "
3	XCI	21	39	1,502 Gr.	10—12te "
4	XCII	20	39	1,61 Gr.	14—16te "
5	XCI	22	39	1,509 Gr.	17—19te "
6	XCIV	23	39	1,457 Gr.	21—23te "

so tritt uns in den ersten drei Vorversuchen, welche auf einen Zeitraum von circa zehn Stunden fallen, das Maximum der CO₂-Abscheidung in der Zeit von der vierten bis zur sechsten Stunde nach der Fütterung entgegen, d. h. in der Zeit, während welcher das Thier wahrscheinlich noch sehr lebhaft verdaut. — In den darauf in zwei Mal 12 Stunden an zwei auf einander folgenden Tagen vorgenommenen Untersuchungen, welche die Verdauungszeit innerhalb vierundzwanzig Stunden nach der Fütterung beobachten sollten, bleibt die Kohlen-

säureproduktion von der zweiten bis zur siebenten resp. achten Stunde auf gleicher Höhe, um dann mässig zu fallen.

Bei den Versuchen mit der schwarzen Katze A, welche, nach der Stundenfolge einer 24stündigen Verdauungsperiode geordnet, nachstehende Reihe bilden:

Versuch über eine 24stündige Verdauungs-
periode bei Katze A.

Lauf.Nr.	Nr. des Versuchs	Aussen-temperatur	Temp. des Thieres	Producirte CO ₂ per Stunde	Zeit seit der Fütterung
Vorversuche		° C.	° C.		
1	LXXXIX	21	39	4,543 Gr.	2—4te Stunde
2	LXXVII	20	39	3,382 Gr.	4—6te "
3	LXXVIII	20	39	4,7336 Gr.	7—9te "
Versuche					
1	LXXX	21	39	4,075 Gr.	2—4te "
2	LXXXI	21	39	5,877 Gr.	6—8te "
3	LXXXII	21	39	4,898 Gr.	10—12te "
4	LXXXIII	20	39	2,809 Gr.	14—16te "
5	LXXXIV	22	39	2,79 Gr.	17—19te "
6	LXXXV	23	38,5	2,061 Gr.	21—23te "

giebt in den Vorversuchen den höchsten Werth die Zeit von ungefähr der siebenten bis zur neunten Stunde nach dem Fressen; bei den späteren gleichfalls wie oben in zwei Mal zwölf Stunden innerhalb zweier Tage angestellten Versuchen fällt das Maximum in die sechste bis achte Stunde nach der Fütterung. In den nächsten Stunden sinkt die CO₂-Production merkbar ab; später fällt sie rapid, so dass

das Minimum von 2,061 Gr. einem fast drei Mal so grossen Maximum von 5,877 Gr. gegenübersteht. Diese Werthe sind um so auffälliger, als uns derartige Schwankungen bei den früheren Versuchen mit Kaninchen nie vorgekommen sind; als eine etwaige Erklärung könnte man dem gegenüber die Individualität der Katze als Raubthier mit dem im Gegensatz zu den Nagethieren kurzen Verdauungstractus anführen, welcher eine raschere, aber um so intensivere Verdauung bedingt. Ferner fällt jedenfalls der Umstand ins Gewicht, dass die schwarze Katze vor dem Versuche fast überreichliche Nahrung zu sich nahm, während die graue Katze nur spärlich von dem dargereichten Futter frass, was uns einigermassen über die hohen Resultate bei der Katze A gegenüber der Katze B aufklärt. Weiterhin dürfte noch von Einfluss gewesen sein, dass die schwarze Katze A in dem grösseren Apparate nicht in ihren Bewegungen gehemmt war und sich auch, wie beobachtet, lebhaft darin umherbewegte, während die graue Katze B gezwungen war, unter der Glasglocke des dritten Apparates still zu liegen und anscheinend schlief. Trotz aller dieser Deutungen und etwaigen Erklärungen war es meine Absicht, jene Auffälligkeiten noch genauer experimentell zu prüfen, was aber durch den nach einigen Tagen eintretenden Tod der Katze B — wahrscheinlich Mercurialvergiftung, welche wohl dieselbe Aetiologie wie bei den Ratten hatte — unmöglich gemacht wurde. Während der Versuche zeigte sich jedoch das Thier munter und gesund und ist ein etwaiger Einfluss einer Krankheit auf die CO_2 -Produktion nicht anzunehmen. — Durch die sogleich nach Beendigung meiner Arbeit von anderer Seite fortgesetzten Versuche wird diese Frage vielleicht aufgeklärt werden.

Halten wir nun am Schlusse der Arbeit einen kurzen Ueberblick über die gewonnenen Resultate, so zeigen uns die Temperaturversuche, dass Kaninchen innerhalb der

Temperaturen von 10 bis 14° C. eine ziemlich gleichmässige Menge CO₂ abscheiden und dass sie jenseits dieser Grenzen mehr CO₂ produziren; letzteres also nicht allein beim Sinken der Temperatur (10–2° C.), sondern auch beim Steigen derselben (14–16° C.). Ein Schwanken der Körpertemperatur des Thieres wurde bei diesen Versuchen nicht beobachtet.

Die Hungerversuche ergaben, dass in den ersten Hungertagen ein geringes, in den folgenden ein beträchtliches Sinken der CO₂-Menge eintritt und dass ebenso bei der Wiederanfütterung die produzierte CO₂ zunächst nur ganz unbedeutend und erst vom dritten Tage an erheblicher wächst. Im Grossen und Ganzen ging bei dieser Versuchsreihe mit dem Steigen und Fallen der CO₂-Menge ein Steigen und Fallen der Körpertemperatur des Thieres parallel. Auffallend war, dass das Gewicht des Thieres, nachdem dasselbe in fünf Hungertragen von 1980 auf 1400 Gr. gesunken war, auch am ersten und zweiten Anfütterungstage noch weiter sank — noch um 150 Gr. Diese Erscheinung dürfte mit der Annahme zu erklären sein, dass das Thier durch die Hungerperiode gezwungen und gewöhnt wurde, seinen C- und N-Bedarf aus dem Material seines Körpers zu decken und dass es, selbst als es Nahrung erhielt, dieser aufgezwungenen Gewohnheit, wenn auch in geringerem Maasse als vorher, folgte. Erst am vierten Anfütterungstage zeigt sich in dieser Beziehung ein vollkommener Umschlag, die Kohlensäureausscheidung steigt um geringe, aber gleichmässige Werthe an, zugleich nähert sich das Körpergewicht mit einer täglichen Zunahme von etwa 150 Gr. der Höhe, welche das Thier bei Beginn sowohl der Hungerperiode als auch der Periode mit reichlicher Ernährung inne gehabt hatte.

Die speziellen Untersuchungen über die CO₂-Produktion

einzelner Zeitabschnitte innerhalb einer 24stündigen Verdauungsperiode liessen das Maximum der Kohlensäureausscheidung auf die dritte bis achte Stunde nach der Fütterung fallen; von da ab sank die CO_2 -Menge allmählich und erreichte ihr Minimum in der einundzwanzigsten bis dreiundzwanzigsten Stunde.

Zum Schlusse drängt es mich, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. J. Rosenthal und Herrn Dr. Schulz für ihren gütigen Rath meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

